

**ADRIANA C. (Ayuno)**

Femenina de 40 años, originaria de Abasolo Gto, Ama de casa, casada, católica

Antecedentes Heredo-familiares de cáncer uterino, cabeza y cuello, además de hijo con cáncer de recto.

Antecedentes personales patológicos de enfermedad ácido-péptica en autocontrol con omeprazol.

Tumoración de mama izquierda de 6 x 5.5 cm con retracción de piel, indurada, irregular, con adenopatía axilar ipsilateral móvil menor de 1 cm clasificada como BIRADS 5 mediante mastografía.

Biopsia: Carcinoma ductal infiltrante no específico Grado 2 con carcinoma in situ clasificado como T4b N1 M0 (EC IIIB), sin datos de metástasis mediante TAC y gammagrafía

Actualmente en tratamiento mediante Quimioterapia Neoadyuvante con esquema secuencial de antraciclina/alquilante + taxano + Factor estimulante de colonias (8 ciclos)

**Se Inicia intervención dietética (tipo ayuno) antes de inicio de 1er ciclo**

**ELVIA CECILIA N. (Dieta control)**

Femenina de 39 años, originaria de León Gto, Ama de casa, casada.

Sin antecedentes heredo-familiares de importancia.

Antecedentes personales patológicos de Síndrome de Cowden y Lhermitte, bocio multinodular (8cm)

Antecedentes Quirúrgicos por lesiones cerebelosas secundarias a síndromes mencionados en 2002 y 2005

Tumoración en mama izquierda con lesión de 6.5 x 6 cm, dolorosa, sólida con adenopatía axilar ipsilateral móvil menor de 1 cm. Biopsia clasificada como T3, N1, M0 (EC IIIA), sin datos de metástasis mediante TAC, aún sin gammagrama óseo

IHQ: RE 100%. RP 100%. HER2 Negativo. Ki 67 4%

Actualmente en tratamiento mediante Quimioterapia Neoadyuvante con esquema secuencial de antraciclina/alquilante + taxano + Factor estimulante de colonias (8 ciclos)

**Se Inicia intervención dietética (dieta control) antes de inicio de 1er ciclo**

**COMPARACIÓN DE TOXICIDAD CICLO 1****AYUNO - CONTROL****COMPARACIÓN DE TOXICIDAD CICLO 2****AYUNO vs CONTROL**